

XELJANZ®

[citrato de tofacitinib]

Comprimidos de 5, 10, 11 mg⁶
y solución oral⁶ de 1 mg/ml



SIMPOSIO SATÉLITE PFIZER

NUEVAS PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS CON XELJANZ® ¿CUANTO ANTES MEJOR?

PALACIO MUNICIPAL IFEMA, Salón Madrid

14 de mayo de 2025

9:00h - 9:50h



Moderador:

Dr. José Luis Pablos

*Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid*



Ponentes:

Dra. Victoria Navarro

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Dr. Hèctor Corominas

*Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona*

En el caso de que se distribuya de forma digital Ficha Técnica XELJANZ® 5 y 10 mg disponible [aquí](#).

En el caso de que se distribuya de forma digital Ficha Técnica XELJANZ® 11 mg disponible [aquí](#).

En el caso de que se distribuya de forma digital Ficha Técnica de XELJANZ® 1 mg/ml solución oral disponible [aquí](#).

⁶La dosis de Xeljanz® de 5 mg 2v/d está aprobada para el tratamiento de la AR, APs, EA, AIJcp y APsj (niños con peso \geq 40 kg) y CU. La dosis de Xeljanz® de 10 mg 2v/d está aprobada solo para el tratamiento de la CU. La dosis recomendada es de un comprimido de liberación prolongada de 11 mg administrado una vez al día, y no debe excederse. La dosis de 11 mg una vez al día está indicada para el tratamiento de la AR, APs y EA. ⁶La solución oral está aprobada para niños mayores de 2 años con AIJcp o APsj con dosis en función del rango de peso [0-<20 kg: 3,2 mg (3,2 ml de solución oral) 2v/d; 20-<40 kg 4 mg (4 ml de solución oral) 2v/d; \geq 40 kg 5 mg (5 ml de solución oral) 2v/d]. *Xeljanz® en combinación con metotrexato (MTX) está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) activa de moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido de forma adecuada o que son intolerantes, a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Xeljanz® puede administrarse en monoterapia en caso de intolerancia a MTX o cuando el tratamiento con MTX no sea adecuado. ** Xeljanz® en combinación con MTX está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica (APs) activa en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada o que han sido intolerantes a un tratamiento previo con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME). *Xeljanz® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerosa (CU) activa de moderada a grave que han tenido una respuesta insuficiente, una pérdida de respuesta o han sido intolerantes al tratamiento convencional o a un medicamento biológico. **Xeljanz® está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil de curso poliarticular activa (poliartritis con factor reumatoide positivo [FR+], poliartritis con factor reumatoide negativo [FR-] y oligoartritis extendida) y de la artritis psoriásica juvenil (APs) en pacientes de 2 años de edad o mayores, que no han respondido de forma adecuada a la terapia previa con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME).

Xeljanz® puede administrarse en combinación con metotrexato (MTX) o como monoterapia en caso de intolerancia a MTX o cuando el tratamiento continuado con MTX no sea adecuado. *Xeljanz® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa que han respondido de forma inadecuada al tratamiento convencional.

2v/d: dos veces al día; **AIJcp:** Artritis Idiopática Juvenil de Curso Poliarticular; **APs:** Artritis Psoriásica; **APsj:** Artritis Psoriásica Juvenil; **AR:** artritis reumatoide; **CU:** colitis ulcerosa; **EA:** Espondilitis Anquilosante.

1. Fichas técnicas de XELJANZ® (citrato de tofacitinib). Pfizer Europe MA EEIG.

PRESENTACIONES Y PRECIO. XELJANZ 5 mg, 56 comprimidos recubiertos con película: PVL: 824€; PVP: 879,91€; PVP IVA: 915,11€. XELJANZ 10 mg, 56 comprimidos recubiertos con película: PVL: 1.648€; PVP: 1.703,91€; PVP IVA: 1.772,07€. XELJANZ 11 mg, 28 comprimidos de liberación prolongada: PVL: 824€; PVP: 879,91€; PVP IVA: 915,11€. XELJANZ 1 mg/ml solución oral, 1 frasco conteniendo 240 ml de solución oral: PVL: 706,29€; PVP: 762,20€; PVP IVA: 792,69€. **CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN.** Con receta médica. Diagnóstico hospitalario. Fármaco de Dispensación Hospitalaria sin Cupón Precinto (DIHSC): se limita su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales; por lo tanto, irá desprovisto de cupón precinto. **CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.** Financiado por el Sistema Nacional de Salud mediante condiciones especiales, sin aportación. Información disponible en la web del Ministerio de Sanidad <https://www.mscbs.gob.es/home.htm>.

Ficha Técnica de XELJANZ®
1 mg/ml solución oral
también disponible aquí:



Ficha Técnica
de XELJANZ® 5 y 10 mg
también disponible aquí:



Ficha Técnica
de XELJANZ® 11 mg
también disponible aquí:

